2014年8月作成 (記載要領変更に伴う改訂)

使用前にこの添付文書を必ずお読みください. また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください.

5つのビタミン&アミノ酸類が 目の疲れ・かすみに効く

眼科用薬



第3類医薬品



現代社会では、テレビ、新聞、パソコン、ワープロ、車の運転など目を酷使する機会が多くなっています.

その結果,目の疲れ,目のかすみ,充血などの症状を訴える人が老若を問わず増えてきています.

シャルマンは、赤い色のビタミンB12をはじめビタミンEやビタミンB6などの6種類の有効成分を配合した目薬で、目の組織の血流を良くし、栄養の補給を助け、目の酷使による症状を改善してくれます.



使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人.
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人.
 - (3)次の症状のある人. はげしい目の痛み
 - (4)次の診断を受けた人. 緑内障
- 2. 使用後, 次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので, 直ちに使用を中止し, この文書を持って医師, 薬剤師又は登録販売 者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 3. 次の場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1)目のかすみが改善されない場合
 - (2)2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着している時の不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1回2~3滴,1日3~6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください.
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。

成分•分量

本製品は、100mL中に次の成分・分量を含んでいます.

成 分	分量	作用
シアノコバラミン(ビタミンB12)	10 mg	目の調節機能を高め、目の疲れに効きます.
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	50mg	目の新陳代謝を促進します.
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	50mg	末梢の血行を良くして、栄養の補給を助けます.
L-アスパラギン酸マグネシウム・ カリウム(等量混合物)	1000 mg	目に必要な栄養を与え、Mg・Kを補給します.
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	500mg	角膜の水分を保持し、乾燥を防止してくれます.
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	目のかゆみをやわらげます.

添加物: ホウ酸, ホウ砂, クロロブタノール, メチルパラベン, プロピルパラベン、 ℓ-メントール、ポリソルベート80を含有しています.

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください、特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化が生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください.
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります).
- (4) 他の人と共用しないでください.
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください.また,使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください.
- (6) 保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。 その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってから使用してください。
- (7) 本製品の赤色は「シアノコバラミン(ビタミンB₁₂)」の色です. 赤色の液が衣服などにつかないよう,十分注意してください. 点眼される際には,ティッシュを目の下に当ててお使いになることをお勧めします.

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記までお願い申し上げます.

佐賀製薬株式会社 お客様相談窓口

電 話: 0942-92-5656

受付時間: 午前9:00~午後5:00(土,日,祝日を除く)

製造販売元 佐賀製薬株式会社 佐賀県三養基郡基山町小倉481

H-14HA